

COMMUNICATIONS

DEUX NOUVEAUX *CALlichROMIDES* DE L'OUEST AFRICAIN
(COL., CERAMB.)

Par P. LEPESME et St. BREUNING.

Parmi les intéressants matériaux que M. R. MUSSARD a bien voulu nous confier pour détermination, nous avons remarqué un *Philematium* nouveau de la région de Man. Nous remercions vivement M. MUSSARD qui a bien voulu nous abandonner le type dont nous donnons la description ci-dessous.

***Philematium Mussardi*, n. sp.**

Long. : 22 mm. ; larg. : 4 mm. à la base des élytres. — Stature allongée, les élytres rapidement rétrécis de la base à l'apex. Vert foncé, mat sauf sur le pronotum, la région suturale des élytres et leur région humérale. Antennes et pattes brun rouge.

Mandibules très longues, rectilignes, puis brusquement incurvées à l'apex. Labre relativement allongé. Palpes très allongés, plus d'une fois et demie aussi longs que les mandibules, densément pourvus de longues soies. Front plat entre deux carènes longitudinales latérales, avec en outre une carène longitudinale médiane plus faible ; assez grossièrement et densément ponctué. Yeux volumineux, très finement et densément facettés. Tubercules antennifères élevés, mais arrondis au sommet. Troisième article antennaire deux fois plus long que le scape, les articles suivants plus courts, subégaux. Pronotum pourvu de chaque côté d'une forte épine latérale, très large à la base, et de deux légères carènes transversales de part et d'autre d'une faible ligne longitudinale médiane lisse ; assez grossièrement et densément ponctué, en outre faiblement ridé dans sa moitié basilaire. Écusson triangulaire, brillant comme les côtés des calus huméraux. Élytres granulés-ponctués. Tous les fémurs très fortement échancrés, même les antérieurs.

Type de Côte d'Ivoire : Man (R. MUSSARD, VIII-1948), dans la collection LEPESME.

Proche de *Ph. calcaratum* Chvrl., de Sierra Leone, Gold Coast, Togo, Nigeria, Afrique centrale, mais en différant nettement par une taille sensiblement plus allongée et par la livrée.

Tarsotropidus Rothi, n. sp.

Proche de *speciosus* Dalm., de Sierra Leone, mais de stature nettement moins allongée. Mandibules un peu moins longues. Scape densément et assez grossièrement ponctué sur sa face dorso-apicale. Pronotum transverse. Élytres moins de trois fois plus longs que la tête et le pronotum réunis. Tout le corps d'un vert métallique, les côtés du pronotum et le disque des élytres couverts de pubescence vert foncé. Antennes jaune rougeâtre.

Long. : 20 mm. ; larg. : 4 mm.

Type de Côte d'Ivoire : Adiopodoumé (M. Roth, 1-III-1954), dans la collection LEPESME.

Deux exemplaires de Guinée française appartiennent sans aucun doute à la même espèce, mais s'en distinguent par une pubescence unicolore noire sur le pronotum et une pubescence noirâtre sur les élytres (v. *guineensis, nova*).

Type de Guinée française : Konakry, 8-x-1912, dans la collection LEPESME. — Un Paratype, *idem*.